АСИММЕТРИЯ И ПРОГНОЗ

Как предсказать событие де-синхронизации двух
осцилляторов в обычно синхронизированной системе,
не зная систему

Е.Блантер, М.Елаева, А.Шаповал, М.Шнирман

Введение: от синхронизации осцилляторов к экстремальным событиям

- Описание фазовой синхронизации двух осцилляторов ([Adler, 1946](#))
- Модель Курамото ([Kuramoto, 1975](#); [Acebron et al, 2005, PRE](#); [Rodrigues et al, 2016](#))
- Модель Курамото-Сакагучи ([Sakaguchi&Kuramoto, 1986](#); [Chen, Engelbrecht & Mirollo, 2019](#))
- Частичная синхронизация или химера ([Omel'chenko et al, 2008, PRL](#); [Parastesh et al, 2021, Physics reports](#))
- Связь положительная и отрицательная ([Hong&Strogatz, 2011,2012](#), [Chowdhuri, et al, 2020, PRE](#))
- Сети, графы ([Perron, 2021, PRE](#); [Rings et al, 2022, Scientific Reports](#)), электрические сети ([Witthaut et al, 2022, Reviews of Modern Physics](#))
- Восстановление связи, восстановление графа связей - сложно ([Ceccini, Rok & Pikovsky, 2021, PRE](#))
- События синхронизации (нейрология) и де-синхронизации (Солнце)

Уравнение Курамото

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1 \dots N,$$

СИНХРОНИЗАЦИЯ: $\dot{\theta}_i \rightarrow \Omega$

Запись через среднюю фазу и параметр порядка $|r| < 1$:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + Kr \sin(\theta - \theta_i)$$

План доклада

- **Прямая задача** в модели цепочки Курамото с тремя осцилляторами: обобщение известной модели для неодинаковых коэффициентов связи, обобщение параметра порядка. Неоднородность связи и асимметрия параметра порядка.
- **Обратная задача**: определение асимметрии параметра порядка по разности фаз двух осцилляторов при помощи решения обратной задачи.
- **Инвариантные** свойства асимметрии
- **Прогноз**: использование асимметрии параметра порядка для прогноза редких событий десинхронизации между осцилляторами

Цепочка из трех осцилляторов модель Курамото:

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1 + q_1 \sin(\theta_2 - \theta_1)$$

$$\dot{\theta}_2 = \omega_2 + q_1 \sin(\theta_1 - \theta_2) + q_2 \sin(\theta_3 - \theta_2)$$

$$\dot{\theta}_3 = \omega_3 + q_2 \sin(\theta_2 - \theta_3)$$

Естественные частоты и СВЯЗЬ ПОСТОЯННЫ

Синхронизация $\theta_i - \theta_j = \text{const}$

$$-\frac{\pi}{2} < \theta_1 - \theta_3 < \frac{\pi}{2}$$

$$k = (q_1 + q_2)/2$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta_1 - \theta_3 < \frac{3\pi}{2}$$

$$\Delta k = (q_1 - q_2)/2$$

Обобщенный параметр порядка:

$$r = \frac{q_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) + q_2 \cos(\theta_2 - \theta_3)}{|q_1| + |q_2|}$$

Параметр порядка и его асимметрия

$$A = |r(\sigma) - r(-\sigma)|$$

Интенсивность связи: Неоднородность связи:

$$s = \max(|k|, |\Delta k|), \quad \sigma = \begin{cases} \frac{\Delta k}{k} & \text{if } s = |k| \\ \frac{k}{\Delta k} & \text{if } s = |\Delta k| \end{cases}$$

$$s > 0, \quad -1 < \sigma < 1$$

Параметр порядка:

$$r = \begin{cases} \frac{1+\sigma}{2} \cos(\alpha + \beta) + \frac{1-\sigma}{2} \cos(\alpha - \beta), & s = |k| \\ \frac{1+\sigma}{2} \cos(\alpha + \beta) - \frac{1-\sigma}{2} \cos(\alpha - \beta), & s = |\Delta k| \end{cases}$$

$$\alpha = (\theta_1 - \theta_3)/2, \quad \beta = (\theta_1 + \theta_3)/2 - \theta_2$$

Прямая задача:

- Исследована цепочка Курамото с произвольными коэффициентами связи
- Модель реализует три типа поведения: синхронизацию, частичную синхронизацию и десинхронизацию.
- Связь в цепочке описана через интенсивность s и коэффициент неоднородности связи σ
- Обобщен параметр порядка r
- Введена асимметрия параметра порядка A

Асимметрия для двух осцилляторов: описание через воображаемую цепочку

Восстановление естественных частот

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1 + q_1 \sin(\theta_2 - \theta_1)$$

$$\dot{\theta}_2 = \omega_2 + q_1 \sin(\theta_1 - \theta_2) + q_2 \sin(\theta_3 - \theta_2)$$

$$\dot{\theta}_3 = \omega_3 + q_2 \sin(\theta_2 - \theta_3)$$

$$\hat{\omega}_1 = \frac{3}{2}\Omega - \frac{\hat{\omega}_2}{2} + \Delta\hat{\omega}, \quad \hat{\omega}_3 = \frac{3}{2}\Omega - \frac{\hat{\omega}_2}{2} - \Delta\hat{\omega}$$

$$\alpha = (\theta_1 - \theta_3)/2, \quad \beta = (\theta_1 + \theta_3)/2 - \theta_2$$

$$k = (q_1 + q_2)/2 \quad \Delta k = (q_1 - q_2)/2$$

Задается как параметр

Выражается из уравнений в предположении синхронизации

$$\dot{\alpha} = \Delta\omega - k \sin \alpha \cos \beta - \Delta k \sin \beta \cos \alpha,$$

$$\dot{\beta} = \frac{3}{2}(\Omega - \omega_2) - 3k \sin \beta \cos \alpha - 3\Delta k \sin \alpha \cos \beta$$

Известно

Интенсивность
связи
достаточная для
само-
согласованного
восстановления

$$\hat{s}^2 > \begin{cases} \frac{(\Omega - \omega_2)^2}{4(\cos^2 \tilde{\alpha} + \hat{\sigma}^2 \sin^2 \tilde{\alpha})} \left(1 + \left(\frac{(1 + \hat{\sigma}) \sin 2\tilde{\alpha}}{2(\hat{\sigma} \sin^2 \tilde{\alpha} - \cos^2 \tilde{\alpha})} \right)^2 \right), & \hat{s} = |\hat{k}| \\ \frac{(\Omega - \omega_2)^2}{4(\hat{\sigma}^2 \cos^2 \tilde{\alpha} + \sin^2 \tilde{\alpha})} \left(1 + \left(\frac{(1 + \hat{\sigma}) \sin 2\tilde{\alpha}}{2(\sin^2 \tilde{\alpha} - \hat{\sigma} \cos^2 \tilde{\alpha})} \right)^2 \right), & \hat{s} = |\Delta \hat{k}| \end{cases}$$

$$\hat{s}^2 > \begin{cases} \frac{(\Omega - \omega_2)^2}{4(\cos^2 \tilde{\alpha} + \hat{\sigma}^2 \sin^2 \tilde{\alpha})} \left(1 + \left(\frac{(1 - \hat{\sigma}) \sin 2\tilde{\alpha}}{2(\hat{\sigma} \sin^2 \tilde{\alpha} + \cos^2 \tilde{\alpha})} \right)^2 \right), & \hat{s} = |\hat{k}| \\ \frac{(\Omega - \omega_2)^2}{4(\hat{\sigma}^2 \cos^2 \tilde{\alpha} + \sin^2 \tilde{\alpha})} \left(1 + \left(\frac{(1 - \hat{\sigma}) \sin 2\tilde{\alpha}}{2(\sin^2 \tilde{\alpha} + \hat{\sigma} \cos^2 \tilde{\alpha})} \right)^2 \right), & \hat{s} = |\Delta \hat{k}| \end{cases}$$

$$s_0^2 = \begin{cases} \frac{(\Omega - \omega_2)^2}{4 \cos^2 \tilde{\alpha}} \left(1 + \frac{\sin^2 2\tilde{\alpha}}{\cos^2 2\tilde{\alpha}} \right), & \hat{s} = |\hat{k}| \\ \frac{(\Omega - \omega_2)^2}{4 \sin^2 \tilde{\alpha}} \left(1 + \frac{\sin^2 2\tilde{\alpha}}{\cos^2 2\tilde{\alpha}} \right), & \hat{s} = |\Delta \hat{k}| \end{cases}$$

Обратная задача

в применении к кольцу из трех осцилляторов

- **Модель:** Рассматривается модель Курамото из трех осцилляторов, где каждый связан с каждым. Выбираются параметры, при которых наблюдается частичная синхронизация.
- **Восстановление:** Для каждой пары осцилляторов решается обратная задача (восстанавливаются естественные частоты) по их разнице фаз в предположении, что они являются крайними в цепочке из трех осцилляторов.
- **Условия:** Восстановление происходит в предположении синхронизации. Используются несимметричные параметры ($\hat{\sigma} \neq 0, \omega_2 \neq \Omega$). Используется достаточно большая интенсивность связи $\hat{s} > s_0$.
- **Целью восстановления является определение асимметрии A**

Восстановление в кольце из трех осцилляторов

Синхронизированная пара осцилляторов

Де-синхронизированная пара осцилляторов

В случае общего положения восстанавливаются переменные естественные частоты

При де-синхронизации меняется знак разницы естественных частот

Само-согласованность нарушается при де-синхронизации

Восстановленная разница естественных частот, нормированная на интенсивность связи.

Разность фаз: **Наблюдаемая** **восстановленная**

Асимметрия в цепочке из трех осцилляторов

Асимметрия и граница синхронизации

1. Берем цепочку с постоянными естественными частотами и σ , моделируем $\alpha(t)$ при разных s .
2. Самосогласованно восстанавливаем $\hat{\omega}_i(t, s)$ при одних и тех же $\hat{\sigma}$ и $\hat{s}$ (большом)
3. Определяем среднюю асимметрию $A(s)$ по всему интервалу времени моделирования

Инвариантные свойства асимметрии

- Асимметрия максимальна на границе синхронизации
- В случае общего положения, с ростом интенсивности связи асимметрия убывает степенным образом
- Если система синхронизирована, то степень убывания асимметрии равна 2
- Если система де-синхронизирована, то степень убывания асимметрии равна 1.

События и асимметрия в модели с частичной синхронизацией

Нормированная
разница
естественных
частот

15-летние
интервалы
времени перед
событием

Разность фаз

Скачки разницы
фаз возникают при
де-синхронизации

Асимметрия в
обратной
задаче

Рост асимметрии
по мере
приближения к
событию

Все наклоны равны 1

Если событие есть – наклон 1, если нет - 2

Прогноз и асимметрия в модели

Интенсивность связи $\hat{s} = 128$

граница
само-
согласованности

Разница
фаз

Асимметрия

Прогноз в модели

- Рост асимметрии предшествует де-синхронизации
- Аномально большая асимметрия возникает при достаточной интенсивности связи $\hat{s} > s_0$
- Ложных тревог не возникает

Солнечные данные: постановка задачи

11-летний
солнечный цикл

Фаза солнечного цикла

Прогноз
следующего
цикла по
полярному полю
предполагает
синхронизацию

Нарушение
цикла

Аномальные
циклы могут
вызываться де-
синхронизацией

Как
спрогнозировать
де-синхронизацию
по фазовым
данным?

Приложение к солнечным данным

- Рассматриваются фазовые данные индексов, отражающих магнитное поле Солнца (площади групп солнечных пятен на разных широтах, HSN, индексы полярных факелов MWO\WSO, Пулково, полярное поле WSO)
- Предположение об их связи происходит из теории солнечного динамо
- Предположение о фазовой синхронизации происходит из 11-летнего солнечного цикла
- Данные рассматриваются независимо в северной и южной полусферах

События и асимметрия в Солнце: южная полусфера

Тревога при недостаточной интенсивности связи

Тревога при достаточной интенсивности связи

граница самосогласованности

Разница фаз

Асимметрия

Скачок фазы

Подъем асимметрии на 3 порядка

Интенсивность связи $\hat{s} = 128$

События и асимметрия в Солнце: северная полусфера

Тревога при недостаточной
ИНТЕНСИВНОСТИ СВЯЗИ

граница
само-
согласованности

Разница
фаз

Асимметрия

Подъем
асимметрии
на
1-2 порядка

Результаты

- Определен новый функционал «асимметрия параметра порядка», аномальный рост которого является предвестником фазовой де-синхронизации
- Асимметрия предсказывает скачки фазовой разницы в модели и в солнечной активности
- Асимметрия потенциально может дать ложную тревогу там, где необходимая интенсивность связи превышает выбранную.

Заключение: открытые вопросы

- Полярное поле – это важные, но «плохие» данные. Важные, потому что по ним прогнозируется следующий цикл (Petrovay, 2021). Как понять, насколько плохие?
- Имеется предвестник, который реагирует на де-синхронизацию, но не только на нее. Можно ли разделить разные типы де-синхронизации по асимметрии?
- Возможное применение к Солнцу: оценка вероятной успешности прогноза максимума солнечного цикла по полярному полю. Как тут ставится задача?
- Возможно ли применение к сейсмичности? Как прогноз события или как оценка прогноза?